


**Figure 1.** Les seuils de statines pour le traitement en pédiatrie



1. Reprendre le BLJ de deux semaines à trois mois après le test de dépistage initial.
  2. Envisager d'administrer des suppléments nutritionnels (phytostérols et psyllium).
  3. D'ordinaire, les statines sont amorcées entre l'âge de huit et 12 ans. Il est à souligner que dans la population pédiatrique, les seuils de traitement aux statines reposent largement sur des avis d'experts.
  4. Voir le tableau 2 pour connaître les affections et les facteurs de risque élevés, de risque modérés et à risque.
- BLJ bilan lipidique à jeun; non HDL-C cholestérol non à lipoprotéines de haute densité; LDL-C cholestérol à lipoprotéines de basse densité; Hfx- ou Hfx+ histoire familiale négative ou positive; IMC indice de masse corporelle; MCV maladie cardiovasculaire

**Source :** Cette figure a été publiée en anglais par le Journal canadien de cardiologie 38(8), Khoury M, Bigras JL, Cummings EA et coll. The detection, evaluation, and management of dyslipidemia in children and adolescents: A Canadian Cardiovascular Society/Canadian Pediatric Cardiology Association clinical practice update:1168-79. © Elsevier 2022. Traduction autorisée.