Diagnostic du diabète chez les enfants : information pour les professionnels de la santé

Au Canada, au moins un enfant d'âge scolaire sur 300 est atteint de diabète.

Si les signes du diabète de type 1 et 2 ne sont pas détectés ou si le diabète n'est pas traité rapidement, les enfants pourraient développer une acidocétose diabétique.

PORTEZ UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AUX ENFANTS QUI PRÉSENTENT L'UN DES SYMPTÔMES SUIVANTS :

Polyurie
(fréquence excessive des mictions ou apparition récente d'une incontinence nocturne)

Polydipsie
(soif excessive/ consommation excessive de liquide)

Perte de poids inexpliquée

Baisse d'énergie

AGISSEZ IMMÉDIATEMENT

- Procédez à une analyse d'urine en utilisant une bandelette réactive OU en procédant à une analyse instantanée du sang capillaire **dans votre cabinet.**
- Si l'analyse d'urine confirme la présence de glucose *(avec ou sans cétones)* ou si le taux de glycémie est élevé, vous devez **immédiatement discuter du cas de cet enfant avec l'hôpital le plus proche où se trouve un pédiatre de garde.**
- Si vous n'êtes pas en mesure de rejoindre **immédiatement un pédiatre de garde**, veuillez référer cet enfant directement aux services des urgences le plus proche afin qu'il puisse être évalué et traité.

NE TARDEZ PAS!

Ne recommandez **pas** des analyses en laboratoire pour un enfant présentant des symptômes puisqu'il pourrait développer une acidocétose avant que les analyses ne soient faites ou que les résultats ne soient examinés!

linktr.ee/informationforhcp

Pour plus d'information, balayez ce code QR.

Canadian Paediatric Society / Société canadienne de pédiatrie

DIABÈTE CANADA

CPEG GCEP
Canadian Pediatric Endocrine Group
Groupe canadien d'endocrinologie pédiatrique

Version : 27-août-2025