

M R S O P A

M	Ajuster le masque	Réappliquez le masque et soulevez la mâchoire vers l'avant. Envisagez la technique à deux mains.
R	Repositionner la tête et le cou	Placez la tête en position neutre ou légèrement en extension.
<i>Administrez 5 insufflations et évaluez l'excursion thoracique. En l'absence d'excursion thoracique, passez aux étapes suivantes.</i>		
S	Aspirer les sécrétions de la bouche et du nez	Utilisez une poire ou une sonde d'aspiration.
O	Ouvrir la bouche	Utilisez un doigt pour ouvrir doucement la bouche.
<i>Administrez 5 insufflations et évaluez l'excursion thoracique. En l'absence d'excursion thoracique, passez à l'étape suivante.</i>		
P	Augmenter la pression	Augmentez par paliers de 5 cm H ₂ O jusqu'à la pression maximale recommandée. 40 cm H ₂ O pour les nouveau-nés à terme; 30 cm H ₂ O pour les prématurés
<i>Administrez 5 insufflations et évaluez l'excursion thoracique. En l'absence d'excursion thoracique, passez à l'étape suivante.</i>		
A	Utiliser une autre méthode de ventilation	Insérez un masque laryngé ou une sonde trachéale.
<i>Essayez la VPP, puis évaluez l'excursion thoracique et les murmures vésiculaires.</i>		